Popular Democratic Republic Of Algeria

Ministry of High Education and Scientific Research

Abbes Laghrour Univercity – Khenchela –

Natural and life sciences Faculty

Molecular and Cellular Biology Department

N° de série :.....

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES DE MASTER ACADEMIQUE

Option : Sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biochimie appliquée

LE THEME

Composition cosmétique réparatrice à base d'huile de crucifère et de phytocéramidespour la restauration de la fibre capillaire

Présenté par :

Mekhalfia Afaf & Slimani Rayene

Devant le jury composé de :

Présidente : LAOUR Souhila, Université Abbès Laghrour-Khenchela.

Directrice de mémoire : Dr BOUHALIT Samira, Université Abbès Laghrour-Khenchela.

Examinateur : Dr MAAMER Hichem Université Abbès Laghrour-Khenchela.

Represantant de CATI : Dr MELLAL Hanane , Université Abbès Laghrour-Khenchela.

Represantant économique : MOUKDAD Saad, Contrôle de qualité Direction du Commerce. Khenchela

Année universitaire : 2025/2026

REMERCIEMENT

Nous remercions tout d’abord Dieu Tout-Puissant de nous avoir accordé la santé, la patience et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce projet.

Nos remerciements les plus chaleureux s’adressent à notre directrice de mémoire, Madame le Docteur BOUHALIT Samira, enseignante-chercheuse au Département des Sciences de la Nature, Université AbbèsLaghrour – Khenchela, pour sa précieuse guidance, sa disponibilité constante, ses conseils éclairés et sa rigueur scientifique tout au long de cette recherche. Son exigence intellectuelle et son soutien inconditionnel ont été pour nous une source d’inspiration et de motivation.

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers les membres du jury pour l’honneur qu’ils nous font en acceptant d’évaluer ce travail.

Nos sincères remerciements vont également à l’ensemble du personnel du Laboratoire Pédagogique de Khenchela pour son assistance technique et sa collaboration durant les phases expérimentales.

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l’accomplissement de ce mémoire.

Enfin, nous dédions ce travail à toutes les femmes qui, comme nous, croient en la valeur de la recherche scientifique et au potentiel des ressources naturelles pour le bien-être de l’humanité.

Avec toute notre gratitude et notre respect.

Slimani Rayene & Mekhalfia Afaf

DEDICACES

« L'amour familial est la première école de la vie, et le foyer est le sanctuaire où se forge l'âme. »

C'est avec un profond sentiment de gratitude et une grande émotion que je dédie ce travail de *fin de Master aux personnes qui représentent toute ma vie, ma force et mon inspiration.*

À mon cher mari, Mon complice, mon soutien et mon roc. Merci pour ta patience infinie durant ces longues soirées de travail, pour ta compréhension sans faille et pour croire en moi-même lorsque j'en doutais. Ta présence aimante a été ma boussole dans les moments de fatigue et d'incertitude.

À mes chers parents, Pour votre amour inconditionnel, vos sacrifices silencieux et vos prières qui m'ont portée jusqu'ici. Vous m'avez appris la valeur du travail acharné et de l'humilité. Ce succès est autant le vôtre que le mien.

À mes enfants, Ma plus grande fierté et ma source de joie inépuisable. Vous êtes la raison pour laquelle je me lève chaque matin avec détermination. Ce travail est pour vous, pour vous montrer que avec courage et persévérance, tout est possible.

À ma directrice, Dr. Bouhalit Samira, Pour son encadrement précieux, sa disponibilité, ses conseils scientifiques pertinents et sa patience tout au long de ce travail.

À ma binôme Rayene, Pour la complicité, les échanges fructueux et les moments de partage qui ont rendu ce parcours plus lumineux.

À toutes les personnes qui m'ont soutenue, encouragée et accompagnée durant ce parcours académique.

Avec tout mon amour et ma reconnaissance éternelle.

Afaf Mekhalfia

DEDICACES

« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous apportent du bonheur ; elles sont comme des jardiniers précieux grâce à qui nos vies s'épanouissent. »
Marcel Proust

C'est avec un profond sentiment de gratitude et une grande émotion que je dédie ce travail de fin de Master à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

À ma très chère mère, pour son amour inconditionnel, ses sacrifices, son soutien moral et ses prières qui ont été ma source de force et de persévérance.

À mon frère et à ma sœur, pour leur présence bienveillante, leur soutien constant et leur affection inestimable.

À la mémoire de mon cher père, رحمه الله, à qui je dédie ce travail avec tout mon amour et ma reconnaissance. J'aurais tant souhaité qu'il soit témoin de ce moment de réussite.

À mon Encadrant, Dr Bouhalit Samira, pour son encadrement précieux, sa disponibilité, ses conseils scientifiques pertinents et sa patience tout au long de ce travail.

Enfin, je dédie ce travail à toutes les personnes qui m'ont soutenue, encouragée et accompagnée durant ce parcours académique.

Avec toute ma gratitude et mon respect.

Slimani Rayene

RESUME

Le défrisage chimique est une pratique largement utilisée pour modifier durablement la structure des cheveux. Cependant, ce traitement provoque souvent une altération de la fibre capillaire caractérisée par une dégradation de la cuticule, une perte des lipides naturels et une diminution de la résistance mécanique du cheveu. Face à cette problématique, ce travail a porté sur le développement d'un sérum capillaire réparateur à base d'huile d'Eruca sativa et de phytocéramides destiné aux cheveux fragilisés par défrisage.

L'étude a commencé par la caractérisation phytochimique de l'huile d'Eruca sativa afin de mettre en évidence sa richesse en composés bioactifs susceptibles de contribuer à la protection et à la réparation de la fibre capillaire. Les analyses ont révélé la présence de métabolites d'intérêt ainsi qu'une activité antioxydante appréciable évaluée par le test du DPPH. L'huile a également présenté une activité anti-hémolytique significative, témoignant de son potentiel protecteur vis-à-vis des membranes biologiques, ainsi qu'une activité antibactérienne contre certaines souches microbiennes. Ces propriétés biologiques confèrent à l'huile un intérêt particulier pour les applications cosmétiques destinées à la protection du cuir chevelu et à la préservation de l'intégrité de la fibre capillaire.

Les phytocéramides ont été incorporés à la formulation pour leur capacité à restaurer la barrière lipidique du cheveu et à améliorer sa résistance aux agressions externes. Le sérum a été formulé puis soumis à différents contrôles de qualité portant sur ses propriétés organoleptiques et physicochimiques, notamment l'aspect, la couleur, l'odeur, l'homogénéité, le pH, la viscosité et la stabilité. Les résultats obtenus ont montré une formulation homogène, stable et adaptée à une application cosmétique capillaire.

Le prototype final développé présente des caractéristiques favorables pour le soin des cheveux sensibilisés par les traitements chimiques. L'association de l'huile d'Eruca sativa et des phytocéramides apparaît ainsi comme une approche naturelle prometteuse pour la réparation, la protection et l'amélioration de la qualité des cheveux défrisés.

Mots-clés :*Eruca sativa*, huile de roquette, phytocéramides, sérum capillaire, défrisage, activité antioxydante, activité anti-hémolytique, activité antibactérienne, réparation capillaire, cosmétique naturelle.

الملخص

يُعدّ الفرد الكيميائي للشعر من أكثر الممارسات شيوعًا لتغيير بنية الشعر بشكل دائم، إلا أنّه يؤدي في كثير من الأحيان إلى إضعاف ألياف الشعر نتيجة تضرر طبقة الكيوتكل وفقدان الدهون الطبيعية وانخفاض المقاومة الميكانيكية للشعرة. وانطلاقًا من هذه الإشكالية، هدفت هذه الدراسة إلى تطوير مصل (سيروم) إصلاحي للشعر يعتمد على زيت ***Eruca sativa*** والفيتوسيراميدات، موجّه للعناية بالشعر المتضرر بفعل عمليات الفرد الكيميائي.

بدأت الدراسة بالتوصيف الكيميائي النباتي لزيت ***Eruca sativa*** للكشف عن المركبات الحيوية الفعالة التي قد تسهم في حماية وإصلاح ألياف الشعر. وأظهرت النتائج غنى الزيت بعدد من المركبات النشطة بيولوجيًا، كما بيّن نشاطًا مضادًا للأكسدة من خلال اختبارDPPH ، مما يدل على قدرته على الحد من تأثير الجذور الحرة المرتبطة بتلف الشعر. كما أظهر الزيت نشاطًا مضادًا لانحلال كريات الدم الحمراء، مما يعكس قدرته على حماية الأغشية الحيوية، بالإضافة إلى نشاط مضاد للبكتيريا تجاه بعض السلالات الجرثومية، وهو ما يعزز إمكانياته في تطبيقات العناية بالشعر وفروة الرأس.

تم إدماج الفيتوسيراميدات في التركيبة نظرًا لدورها في استعادة الحاجز الدهني للشعرة وتحسين مقاومتها للعوامل الخارجية. بعد ذلك، تم تحضير السيروم وإخضاعه لعدة اختبارات جودة شملت الخصائص الحسية والفيزيائية والكيميائية، مثل المظهر واللون والرائحة والتجانس ودرجة الحموضة واللزوجة والثبات. وأظهرت النتائج أن التركيبة متجانسة ومستقرة ومناسبة للاستعمال التجميلي على الشعر.

ويتميز النموذج النهائي المطور بخصائص واعدة للعناية بالشعر المتضرر بالمعالجات الكيميائية، حيث يشكل الجمع بين زيت ***Eruca sativa*** والفيتوسيراميدات مقاربة طبيعية فعالة للمساهمة في إصلاح الشعر وحمايته وتحسين مظهره وجودته.

الكلمات المفتاحية*Eruca sativa* **:**، زيت الجرجير، الفيتوسيراميدات، مصل الشعر، الفرد الكيميائي، النشاط المضاد للأكسدة، النشاط المضاد لانحلال الدم، النشاط المضاد للبكتيريا، إصلاح الشعر، مستحضرات التجميل الطبيعية.

ABSTRACT

Chemical hair relaxing is a widely used practice to permanently alter hair structure. However, this treatment often causes damage to the hair fiber, characterized by cuticle degradation, loss of natural lipids, and reduced mechanical strength. In response to this issue, the present study focused on the development of a repairing hair serum based on *Eruca sativa* oil and phytoceramides for hair weakened by chemical relaxing treatments.

The study began with the phytochemical characterization of *Eruca sativa* oil to identify bioactive compounds that may contribute to the protection and repair of the hair fiber. The results revealed that the oil is rich in biologically active constituents and exhibits significant antioxidant activity, as demonstrated by the DPPH radical scavenging assay. In addition, the oil showed notable anti-hemolytic activity, indicating its ability to protect biological membranes, as well as antibacterial activity against selected microbial strains. These biological properties highlight the potential of the oil for cosmetic applications aimed at protecting the scalp and maintaining hair fiber integrity.

Phytoceramides were incorporated into the formulation because of their ability to restore the lipid barrier of the hair and improve its resistance to external aggressions. The serum was then formulated and subjected to various quality control assessments, including organoleptic and physicochemical evaluations such as appearance, color, odor, homogeneity, pH, viscosity, and stability. The obtained results demonstrated that the formulation was homogeneous, stable, and suitable for cosmetic hair application.

The final prototype exhibited promising characteristics for the care of hair damaged by chemical treatments. The combination of *Eruca sativa* oil and phytoceramides therefore represents a promising natural approach for repairing, protecting, and improving the overall quality of chemically relaxed hair.

Keywords : *Eruca sativa*, rocket seed oil, phytoceramides, hair serum, chemical hair relaxing, antioxidant activity, anti-hemolytic activity, antibacterial activity, hair repair, natural cosmetics.

TABLE DES MATIERE

Remerciements……..... I

Dédicace…….. II

Résumé (français) …… IV

(Arabe)الملخص……. V

Abstract……. VI

Table des matiere……. VII

Liste des tableaux…… X

Liste des figures…… XI

Liste des abréviations……..... XIII

Introduction générale…… 1

MATERIEL ET METHODES 6

1. MATERIEL …….

1.1 Matériel végétal..... 6

1.2 Réactifs et produits chimiques……. 6

1.3 Matériel biologique…….. 7

1.4 Matériel de laboratoire……. 7

2. Méthodes……... 8

2.1 Extraction de l'huile végétale à froid……... 9

2.2 Protocole d'extraction desphytocéramides…….. 8

2.3 Etude Des activités biologiques de l'huile……... 8

2.3.1 Activité antioxydante (Test DPPH)……..... 8

2.3.2 Activité anti-hémolytique……..... 9

2.3.3 Activité antimicrobienne……..... 10

2.3.3.1 Préparation du milieu de culture … ……... 10

2.3.3.2 Préparation des inoculums bactériens……. 10

2.3.3.3 Ensemencement des boîtes de Pétri…… 11

2.3.3.4 Test de diffusion sur disque…… 12

2.3.3.5 Incubation…… 13

2.3.3.6 Lecture des résultats…… 13

3. Formulation et élaboration du sérum capillaire réparateur……... 14

3.1Composition qualitative du sérum……..... 14

3.2Type de formulation……..... 15

3.3Procédé de préparation du sérum ……..... 16

3.3.3.1 Préparation de la phase aqueuse……..... 16
3.3.3.2 Préparation de la phase huileuse……. 16
3.3.3.3 Émulsification……. 16
3.3.3.4 Incorporation des actifs sensibles…… 16
3.3.3.5 Homogénéisation …… 16
3.4Caractéristiques du produit fini……..... 16
3.5 Intérêt cosmétique de la formulation……..... 17
3.6Contrôle qualité du sérum……..... 17
3.6.1 Propriété chimique……..... 17
3.6.2 Propriété physique……..... 17
3.7 Etude statistiques……..... 18
Résultats et discussion……. 19
1.rendement de l' extraction…….. 21
2. Evaluation des activites biologiques Résultats et discussion..... 21
2.1 Evaluationde l'activité antioxydant (DPPH)…….. 21
2.2 . Evaluation de l'activité anti-hémolytique……. 24
2. 3. Evaluation discussion de l'activité antibactérienne…… 25
3. Propriétés physico-chimiques de produit (le sérum capillaire)…… 27
CONCLUSION …… 30
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES…….. 32
ANNEXES…… 35

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 souches bactériennes testé dans l'activité antibactériennes…….. 11

Tableau 2les critères standards de la l'évaluations del'activité antibactérienne…….. 14

Tableau 3 La composition de la formulation de sérum……. 15

LISTE DES FIGURES

Figure 1 .A Graines d'*Eruca sativa Mill BErucasativa* Mill. Plant en culture 6

Figure 2 .l'appariele de l'extraction ……. 6

Figure3. l'huile de *Eruca sativa. Mil*…….... 8

Figure .4l'appareille de l'extraction extracteur des huile végétal 8

Figure 5. Préparation des inoculums bactériens : (A) Suspensions bactériennes dans l'eau physiologique après homogénéisation au vortex ; (B) Comparaison visuelle de la turbidité avec la solution standard de Mc Farland 0,5. 12

Figure 6 : Ensemencement des boîtes de Pétri : (A) Écouvillon stérile imbibé de suspension bactérienne ; (B) Technique d'étalement en 13

Figure7 . Courbe comparative de l'activité antioxydante DPPH• (Huile *d'Erucasativa* vs Acide ascorbique) 21

Figure8. Histogramme comparatif des valeurs d'IC50 de l'huile *d'Eruca sativa* et de l'acide ascorbique. 23

Figure 9. Courbe comparative de l'activité anti-hémolytique 26

Figure 10. Effet del'huile*d'Erucasativa*sur les souchesbactériennesa différents concentrations 28

A : Absorbance

ABTS: 2,2'-Azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique)

AINS : Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens

CE50 : Concentration Efficace 50%

CV : Coefficient de Variation

°C : Degré Celsius

DPPH : 2,2-Diphényl-1-picrylhydrazyle

EDTA : Éthylène Diamine Tétra Acétique

ET : Electron Transfer (Transfertd'électron)

FRAP : Ferric Reducing Antioxidant Power

GAE :ÉquivalentAcideGallique

HAT : Hydrogen Atom Transfer (Transfertd'atomed'hydrogène)

H2O2 :Peroxyded'hydrogène

HPLC-MS : High Performance Liquid Chromatography – Mass Spectrometry

IC50 : Concentration Inhibitrice 50%

L : Litre

mL: Millilitre

mg : Milligramme

min : Minute

nm :Nanomètre

ORAC : Oxygen Radical Absorbance Capacity

PBS : Phosphate Buffered Saline

ROS :ReactiveOxygenSpecies (Espèces Réactives de l'Oxygène)

R^2 : Coefficient de détermination

SD : Standard Deviation (Écart-type)

UV-Vis : Ultraviolet-Visible

µg : Microgramme

µL : Microlitre

µM :Micromolaire

INTRODUCTION GENERALE

Les plantes médicinales et aromatiques constituent depuis l'Antiquité une source essentielle de remèdes naturels utilisés dans les domaines thérapeutique, alimentaire et cosmétique, et elles ont représenté la base de la médecine traditionnelle dans plusieurs civilisations anciennes (Cragg et Newman, 2013). Grâce aux progrès scientifiques et technologiques, l'intérêt porté à ces plantes s'est considérablement accru au cours des dernières décennies, notamment à travers l'étude de leur composition chimique et de leurs propriétés biologiques (Dai et Mumper, 2010). Cette évolution a permis la découverte de nombreux composés bioactifs possédant des applications pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques (Harborne, 1998). Dans un contexte marqué par une orientation mondiale vers les produits naturels et une réduction de l'utilisation des substances chimiques de synthèse, les plantes médicinales apparaissent aujourd'hui comme des ressources prometteuses pour le développement de produits sains et écologiques (Newman et Cragg, 2020).

Parmi les plantes médicinales les plus étudiées figure *Eruca sativa*, communément appelée roquette. Cette plante herbacée annuelle appartient à la famille des Brassicaceae (Fahey et al., 2001). Son nom scientifique est *Eruca sativa* Mill., et elle est largement distribuée dans les régions méditerranéennes grâce à sa capacité d'adaptation (Bell et Wagstaff, 2014).

Depuis l'Antiquité, *Eruca sativa* occupe une place importante dans l'alimentation et la médecine traditionnelle, ses feuilles et graines étant utilisées pour divers usages thérapeutiques (Turan et al., 2007). L'huile extraite de ses graines a été employée en cosmétique traditionnelle pour les soins de la peau et des cheveux (Al-Shehbaz et al., 2006).

Cette plante se distingue par une composition chimique riche en flavonoïdes, composés phénoliques, glucosinolates et acides gras essentiels (Bennett et Wallsgrove, 1994). L'huile de graines de *Eruca sativa* est particulièrement riche en acides gras insaturés tels que l'acide érucique et l'acide oléique (Bell et Wagstaff, 2014). Elle contient également des composés antioxydants comme les tocophérols et caroténoïdes (Higdon et Frei, 2003). Plusieurs études ont montré ses activités biologiques antioxydantes et antimicrobiennes (Burt, 2004).

Le secteur cosmétique connaît actuellement une forte évolution vers les produits naturels et les "Green Cosmetics", répondant à une demande croissante des consommateurs (Draelos, 2018). Dans ce contexte, les huiles végétales représentent des alternatives intéressantes grâce

à leur biocompatibilité cutanée (Cavanagh et Wilkinson, 2005). L'huile de *Eruca sativa* apparaît ainsi comme un ingrédient prometteur en cosmétique naturelle.

Par ailleurs, le terme « roquette » regroupe principalement *Eruca sativa* et *Diplotaxis tenuifolia*, deux espèces de la famille des Brassicaceae présentant des profils phytochimiques proches mais distincts (Pasini et al., 2012). Ces espèces sont riches en glucosinolates, composés responsables de nombreuses activités biologiques (Fahey et al., 2001).

L'importance de *Eruca sativa* ne se limite pas à son intérêt nutritionnel ; elle possède également des propriétés médicinales reconnues en phytothérapie traditionnelle (Ekor, 2014). Des études scientifiques ont confirmé ses activités antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes (Burt, 2004 ; Newman et Cragg, 2020).

L'étude phytochimique des huiles végétales est une étape fondamentale pour identifier leurs composés actifs et comprendre leurs propriétés biologiques (Harborne, 1998). Cependant, malgré les propriétés prometteuses de l'huile d'*Eruca sativa*, peu d'études ont exploré en détail son potentiel cosmétique.

Dans cette perspective, le présent travail vise à développer et évaluer un sérum capillaire réparateur à base d'huile d'*Eruca sativa* et de phytocéramides destiné aux cheveux fragilisés. Cette étude s'inscrit dans une démarche de valorisation des ressources naturelles et de développement de produits cosmétiques durables (Draelos, 2018).

Le plan de cette étude est subdivisé en trois chapitres :

- Le premier chapitre est dédié à une introduction générale qui portera sur la connaissance de la résistance microbienne, sur la phytothérapie et plantes médicinales étudiées, ainsi que sur les composés phénoliques.
- Le deuxième chapitre portera sur une présentation des différentes techniques, matériel et méthodes utilisées.
- Le troisième chapitre portera sur une présentation des résultats obtenus avec une interprétation et discussion. Enfin le travail s'achève par une conclusion et perspectives.

MATERIELS ET METHODES

1-Matériel

1.1 Materiel végétal

Le matériel végétal utilisé dans cette étude est constitué des graines de *Eruca sativa* Mill. (Brassicaceae), obtenues auprès d'un magasin spécialisé dans la vente de semences et de produits agricoles situé à Khenchela, en Algérie. Des graines saines, homogènes et exemptes d'impuretés ont été soigneusement sélectionnées afin d'assurer la qualité du matériel végétal utilisé dans les différentes analyses expérimentales. Après acquisition, les graines ont été conservées dans des récipients en verre hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité et de la lumière jusqu'à leur utilisation.





Figure 1.**A**Graines d'*Erucasativa Mill* B**.** ***Erucasativa*** Mill Plant en culture

1.2 Réactifs et produits chimiques

Les principaux réactifs et produits chimiques utilisés au cours de cette étude sont : (Méthanol, DPPH, Tween 80, PBS, NaCl, EDTA, diclofénac sodique, eau distillée, gélose Mueller-Hinton, McFarland 0,5, vitamine E, huile essentielle, phytocéramides, cyclométhicone, triglycérides capryliques/capriques, huile de jojoba).

1.3 Matériel biologique

Le matériel biologique utilisé dans cette étude comprend :

- Sang humain prélevé chez des donneurs sains pour l'évaluation de l'activité anti-hémolytique
- Souches bactériennes de référence ATCC

- Bacillus cereus ATCC 11778
- Staphylococcus aureus ATCC 25923
- Escherichia coli ATCC 25922
-Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
- Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

1.4 Matériel de laboratoire

Spectrophotomètre UV-Visible, pH-mètre numérique, centrifugeuse, agitateur magnétique chauffant, balance analytique, vortex, micropipettes automatiques, verrerie de laboratoire, boîtes de Pétri stériles, étuve bactériologique, bec Bunsen, presse mécanique à froid pour l'extraction de l'huile, réfrigérateur (4°C) pour la conservation des échantillons.

2. Méthodes

2.1. Extraction de l'huile végétale à froid

L'extraction à froid de l'huile des graines d'*Eruca sativa* a été réalisée par pression mécanique sans apport de chaleur externe, méthode privilégiée pour préserver l'intégrité des composés thermosensibles et bioactifs présents dans l'huile. Cette technique permet de conserver les acides gras insaturés, les tocophérols, les caroténoïdes et les composés phénoliques qui seraient dégradés par une exposition thermique. L'absence de chauffage prévient également l'isomérisation des acides gras et la formation de produits d'oxydation indésirables.

Les graines d'*Eruca sativa* préalablement séchées ont été introduites progressivement dans un pressoir à vis mécanique fonctionnant à une vitesse de rotation contrôlée de 20 à 30 tours par minute. La température de la matrice durant l'opération d'extraction a été surveillée et maintenue en dessous de 40 °C. Le rendement en huile a été calculé gravimétriquement.

L’huile extraite a été immédiatement filtrée puis conservée à 4 °C à l’abri de la lumière





figure.3 l’huile de *Eruca sativa. Mill*Figure .4l’appareille de l’extraction

extracteur des huile végétal

2 .2. Protocole d’extraction des Phytocéramides végétaux.

L’extraction des phytocéramides végétaux a été réalisée selon un procédé d’extraction des composés lipidiques basé sur leur solubilité dans des solvants organiques. La matière végétale a été préalablement séchée puis broyée afin d’augmenter le rendement d’extraction.

Le mélange obtenu a ensuite été filtré puis le filtrat concentré par évaporation sous pression réduite.

2.3Etude Des activités biologiques de l’huile

2.3.1 Activité antioxydante (Test DPPH)

. Dans des tubes à essai propres et secs, mélanger 1950 µL de solution DPPH avec 50 µL de chaque dilution du sérum test. Préparer en parallèle un témoin négatif constitué de 1,95 mL de solution DPPH et 0,05 mL de méthanol pur, et un témoin positif constitué de 1,95 mL de solution DPPH et 0,05 mL de solution acide ascorbique. Agiter vigoureusement chaque tube et maintenir à l'obscurité à température ambiante pendant trente minutes. Mesurer l'absorbance de chaque tube à 517 nm contre un blanc constitué de méthanol pur, à l'aide d'un spectrophotomètre UV-Visible. Réaliser chaque mesure en triplicat

IC50=0.41 mg/mL pour l’huile *d'Eruca sativa*

$$\mathbf{I(} \quad = 0.2 \quad + (\frac{1 \quad \times 2}{2}) \times 1$$

$$\mathbf{I(} \quad = 0.4 \ \ \mathbf{m} \ \ / \mathbf{m}$$

2.3.2 Activité anti-hémolytique (stabilisation des membranes érythrocytaires)

Le sang utilisé pour cette étude a été prélevé chez des donneurs sains n'ayant pris aucun anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) durant les deux semaines précédant le prélèvement. Environ 5 mL de sang ont été recueillis dans des tubes contenant l'EDTA comme anticoagulant. Les échantillons ont ensuite été centrifugés à 1000 rpm pendant 5 minutes afin de récupérer les globules rouges (GR). Après élimination du surnageant, les érythrocytes ont été lavés avec une solution saline tamponnée au phosphate (PBS 0,2 M, pH 7,4) à trois reprises, chaque lavage étant suivi d'une centrifugation à 1000 tr/min pendant 5 minutes. Une suspension érythrocytaire à 4 % d'hématocrite a ensuite été préparée par dilution des globules rouges lavés dans le PBS.

Par ailleurs, les différentes concentrations des extraits ont été préparées dans le PBS aux concentrations de 1 mg/mL, 0,5 mg/mL et 0,25 mg/mL. Pour le test d'hémolyse, 1 mL de suspension d'hématocrite à 4 % a été mélangé avec 0,5 mL des extraits préparés dans le PBS. Les tubes ont ensuite été incubés à 37 °C pendant 20 minutes, puis 0,5 mL d'une solution hypotonique de NaCl à 2 % diluée dans le tampon phosphate a été ajouté afin d'induire l'hémolyse. Après incubation, les mélanges ont été centrifugés à 1000 tours/min pendant 10 minutes et l'absorbance du surnageant a été mesurée à 540 nm. L'eau distillée a été utilisée comme contrôle négatif correspondant à 100 % d'hémolyse, tandis que le diclofénac de sodium a servi de standard de référence. Une diminution de l'absorbance traduit une réduction de l'hémolyse et donc un effet protecteur élevé sur les membranes érythrocytaires. De même, un pourcentage élevé de protection indique une importante activité anti-hémolytique des extraits testés.

2.3.3. Activité antimicrobienne

2.3.3.1Préparation du milieu de culture

Le milieu de culture utilisé était la gélose Mueller-Hinton est le standard international pour les tests de sensibilité aux antibiotiques par diffusion sur disque.
La préparation du milieu a été réalisée selon les recommandations du fabricant avec les proportions suivantes : 14 g de poudre de gélose nutritive pour 500 mL d'eau distillée.

La suspension a été chauffée sur un agitateur magnétique chauffant jusqu'à ébullition complète et dissolution totale de la poudre, obtenant une solution limpide de couleur ambrée

claire . La gélose a ensuite été stérilisée au bain-marie à 100 °C pendant 20 minutes Après refroidissement à température ambiante (environ 45-50 °C), la gélose a été versée aseptiquement dans des boîtes de Pétri stériles de 90 mm de diamètre, sous flux laminaire ou à proximité d'un bec Bunsen, en évitant la formation de bulles d'air .Les boîtes ont été laissées solidifier à température ambiante puis conservées à 4 °C jusqu'à leur utilisation.

2.3.3.2 Préparation des inoculum bactériens

Afin de tester le potentiel antibactérien *in vitro* de l'EECL, cinq souches bactériennes ont été utilisées (Tab1) :

Tableau 1.Souches bactériennes testé dans l'activité antibactérienne

Type de souches	**Espece**	**Références**
Bactéries gram POSITIF	*Bacillus cereus*	ATCC 11778
	Staphylocoque aureus	ATCC25923
Bactéries gram Négatif	*Escherichia coli*	ATCC25922
	Pseudomonas aeruginosa	ATCC27853
	Klebsiella pneumonie	ATCC13883

Les souches bactériennes ont été réactivées par deux passages successifs sur gélose nutritive à 37 °C pendant 18 à 24 .

À l'aide d'une anse de platine stérile, une colonie isolée de chaque souche a été prélevée à partir des boîtes de culture purifiées puis transférée dans un tube contenant 5 mL d'eau physiologique stérile (NaCl 0,9 %) . Les tubes ont été homogénéisés à l'aide d'un agitateur vortex pendant 30 secondes afin d'obtenir des suspensions bactériennes homogènes sans amas cellulaires [50]. La turbidité des suspensions a ensuite été ajustée et standardisée visuellement à celle d'une solution de Mc Farland 0,5 (correspondant à environ $1,5 \times 10^8$ UFC/mL) .




Figure 5. Préparation des inoculums bactériens : (A) Suspensions bactériennes dans l'eau physiologique après homogénéisation au vortex ; (B) Comparaison visuelle de la turbidité avec la solution standard de McFarland 0,5.

2.3.3.3. Ensemencement des boîtes de Pétri

Un écouvillon stérile a été plongé dans chaque suspension bactérienne standardisée, puis utilisé pour réaliser l'ensemencement par étalement uniforme (lawn culture) sur toute la surface des boîtes de gélose nutritive préalablement préparées . L'ensemencement a été réalisé en trois directions perpendiculaires pour assurer une couche homogène de bactéries . Cette opération a été répétée pour les cinq souches bactériennes dans des conditions strictement aseptiques à proximité d'un bec Bunsen allumé .




Figure 6. Ensemencement des boîtes de Pétri : (A) Écouvillon stérile imbibé de suspension bactérienne ; (B) Technique d'étalement en trois directions sur la surface de la gélose

2.3.3.4Test de diffusion sur disque

Des disques de papier Wattman stériles de 6 mm de diamètre ont été utilisés pour évaluer l'activité antibactérienne de l'huile *d'Erucasativa* par la méthode de diffusion en gélose selon les normes du CLSI . Les produits testés ont été répartis comme suit :

Chaque boîte de gélose ensemencée a été divisée en six zones correspondant aux différents traitements. Les disques stériles ont été déposés à la surface de la gélose à l'aide d'une pince stérile, puis imprégnés de 20 µL de chaque solution testée . Toutes les manipulations ont été réalisées dans des conditions strictement stériles à proximité du bec Bunsen.

2.3.3.5 Incubation

Après dépôt des disques, les boîtes de Pétri ont été fermées hermétiquement puis incubées à l'envers (couvercle en dessous) à 37 °C pendant 24 heures dans une étuve thermostatée . L'incubation à l'envers permet d'éviter la condensation d'eau sur la surface de la gélose qui pourrait interférer avec la diffusion des produits

2.3.3.6.Lecture des résultats

Après incubation, l'activité antibactérienne a été évaluée par l'observation macroscopique et la mesure des diamètres des zones d'inhibition de croissance bactérienne (halos clairs) autour

de chaque disque . Les diamètres ont été mesurés au millimètre à l'aide d'un pied à coulisse électronique, en mesurant le diamètre total du halo (y compris le disque de 6 mm) .

L'interprétation a été réalisée selon les critères standardisés suivants :

Tableau2. Les critères standards de l'évaluations de l'activité antibactérienne

Diamètre (mm)	**Interprétation**	**Symbole**
≥ 20	Activité très forte	(++++)
15 – 19	Activité forte	(+++)
10 – 14	Activité modérée	(++)
6 – 9	Activité faible	(+)
< 6	Absence d'activité	(-)

Chaque test a été réalisé en triplicat et les résultats exprimés en moyenne ± écart-type

3-Formulation et élaboration du sérum capillaire réparateur

Le sérum capillaire est un produit cosmétique de soin concentré, destiné à améliorer l'état de la fibre capillaire. Contrairement aux huiles capillaires simples, le sérum est une formulation complexe pouvant contenir une phase aqueuse, une phase huileuse ainsi que des actifs fonctionnels permettant une action synergique (réparation, protection et nutrition).

Dans ce travail, le sérum développé est formulé à base d'huile *d'Eruca sativa* (roquette) et de phytocéramides, afin de répondre aux besoins des cheveux fragilisés par les traitements chimiques tels que le défrisage.

3-1 Composition qualitative du sérum

La formulation du sérum repose sur plusieurs catégories d'ingrédients :

- **Phase huileuse**

Elle constitue la base nourrissante du sérum et comprend :

Huile *d'Eruca sativa* (riche en acides gras essentiels et composés soufrés)

- Éventuellement autres huiles végétales (huile d'argan, huile de coco) pour renforcer l'effet nutritif

- **Phase aqueuse**

Elle permet d'améliorer la texture et la dispersion des actifs :-Hydrolat végétal (selon la formulation)

- **Agents actifs**

Ils assurent l'effet réparateur et protecteur :

-Phytocéramides (restauration de la barrière lipidique du cheveu)

-Vitamine E (effet antioxydant et stabilisant des huiles)

- **Agents auxiliaires**

Ils garantissent la stabilité et la conservation :

Émulsifiant (permet la cohésion entre phase aqueuse et huileuse)

- Conservateur cosmétique (prévention de contamination microbienne)
- Parfum (facultatif pour améliorer l'acceptabilité sensorielle)

Tableau.3 La composition de la formulation est présentée dans le tableau suivant :

Ingrédients	***Pourcentage%***
Cyclométhicone ou silicone vegétal	*15-20%*
Phytocéramides végétaux	*2%*
Huile de jojoba	*10%*
Autre composition	*5-15%*
Triglycérides capryliques /capriqeus	*10-32.2%*
Huile d'Eruca Sativa	*10-25%*
Vitamine E	*0.5%*
Autre huile essentielle	*0.3%*

Cette formulation a été choisie afin d'obtenir un sérum léger, nourrissant et protecteur adapté aux cheveux secs et abîmés.

3-2. Type de formulation

Le sérum élaboré est une **émulsion cosmétique de type huile dans eau (H/E)**, [76]caractérisée par une dispersion fine de la phase huileuse dans une phase aqueuse.

Cette structure permet :

- Une meilleure pénétration des actifs
- Une texture légère non grasse
- Une application facile sans alourdir les cheveux

3-3. Procédé de préparation du sérum

La préparation du sérum suit un protocole précis afin d'assurer la stabilité et l'homogénéité du produit :

3.3.1Préparation de la phase aqueuse

L'eau distillée est chauffée légèrement (environ 40–50°C) puis les composants hydrosolubles (hydrolat, conservateur soluble) sont incorporés sous agitation modérée.

3.3.2. Préparation de la phase huileuse

L'huile *d'Eruca sativa* est mélangée avec les autres huiles végétales ainsi que la vitamine E sous agitation douce jusqu'à homogénéisation.

3.3.3Émulsification

La phase huileuse est ajoutée progressivement à la phase aqueuse sous agitation constante afin de former une émulsion stable. L'émulsifiant est incorporé à ce stade pour stabiliser le système.

3.3.4. Incorporation des actifs sensibles

Les phytocéramides sont ajoutés à température ambiante pour éviter leur dégradation.

3.3.5. Homogénéisation

Le mélange est agité jusqu'à obtention d'une texture uniforme et stable.

3.3.6. Conditionnement

Le sérum est ensuite conditionné dans des flacons opaques stériles afin de protéger les actifs de la lumière et de l'oxydation.

Les échantillons ont été conservés à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe afin de préserver leur stabilité physicochimique et leurs propriétés biologiques.

3.4. Caractéristiques du produit fini

Le sérum obtenu présente les caractéristiques suivantes :

- Aspect : liquide légèrement visqueux
- Couleur : jaunâtre à doré selon les huiles utilisées
- Odeur : naturelle végétale
- Texture : non grasse et facilement absorbée

3.5. Intérêt cosmétique de la formulation

Cette formulation présente plusieurs avantages :

- Réparation de la fibre capillaire endommagée
- Protection contre les agressions extérieures (chaleur, produits chimiques)
- Amélioration de la brillance et de la souplesse des cheveux
- Restauration de la barrière lipidique grâce aux phytocéramides

3.6.Contrôle qualité du sérum

3.6.1. Propriété chimique

Mesure du pH

Le pH du sérum a été mesuré à température ambiante à l'aide d'un pH-mètrepréalablement calibré.

Une petite quantité du sérum a été dispersée dans de l'eau distillée avant la mesure afin d'obtenir une lecture correcte du pH = 5,4

3.6.2.Propriétés physiques

- Étude organoleptique

L'étude organoleptique du sérum a consisté à évaluer ses caractéristiques sensorielles telles que la couleur, l'odeur, l'aspect et la texture.

Le sérum obtenu présentait une texture huileuse homogène, une odeur agréable caractéristique de l'huile essentielle de lavande ainsi qu'un aspect limpide sans séparation de phases.

-Étude de la viscosité

La viscosité du sérum a été déterminée afin d'évaluer sa fluidité et sa facilité d'application sur le cheveu.

L'analyse a montré que la formulation possède une viscosité adaptée permettant une répartition uniforme du produit sans effet gras excessif.

-Test d'homogénéité

Le test d'homogénéité a été réalisé par observation visuelle afin de vérifier l'uniformité de la formulation et l'absence d'agrégats ou de séparation de phases.

Le sérum obtenu était homogène et stable après préparation.

-Test de centrifugation

Le sérum a été soumis à une centrifugation afin d'évaluer sa stabilité physique.

Aucune séparation de phases ni précipitation n'a été observée après centrifugation,ce qui indique une bonne stabilité de la formulation.

-Étude de stabilité

L'étude de stabilité a été réalisée en conservant le sérum dans différentes conditions de température pendant une période déterminée.Les paramètres évalués comprenaient l'aspect, la couleur, l'odeur, l'homogénéitéet la présence éventuelle d'une séparation de phases.

Les résultats ont montré que le sérum conserve ses propriétés physicochimiques et Organoleptiques sans modification significative durant la période de conserva (Draelos, 2018)

3.7 Etudes statistiques

Toutes les analyses ont été réalisées en triple (n = 3). Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± écart-type (M ± ET). Le traitement statistique des données a été effectué à

l'aide du logiciel Microsoft Excel. Cette analyse a permis d'évaluer la reproductibilité et la fiabilité des résultats expérimentaux.

RESULTATS ET DISCUSSION

1. Rendement de l'extraction

Le rendement d'extraction (R %) a été déterminé selon la relation suivante

$$\boldsymbol{R}(\%) = \frac{\boldsymbol{m\,h}}{\boldsymbol{m\,m}\quad \text{è}\boldsymbol{r}} \times \mathbf{1}$$

Pour 100 g de matière première utilisée, une masse de 15 g d'huile a été obtenue. Le rendement d'extraction est donc :

$$\boldsymbol{R}(\%) = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \times \mathbf{1}$$

$$\boldsymbol{R} = \mathbf{1}\ \ \%$$

2.Evaluation desactivitébiologique

2.1 Evaluation del'activité antioxydant(DPPH)

L'activité antioxydante de l'huile de roquette a montré une augmentation progressive avec la concentration. L'absorbance mesurée à 1 mg/ml était de **0,110 ± 0,002**, correspondant à une inhibition de **78 %**, tandis qu'à 0,125 mg/ml l'absorbance était de **0,410 ± 0,003**, avec une inhibition de **18 %**. Ces résultats indiquent une activité antioxydante dépendante de la concentration.




Figure 7: Courbe comparative de l'activité antioxydante DPPH• (Huile *d'Erucasativa* vs Acide ascorbique)

Différents extraits (aqueux, méthanoliques, éthanoliques, hexaniques) de graines, huile et parties aériennes présentent un pouvoir antioxydant élevé dans des tests DPPH, ABTS, FRAP, réduction du fer et piégeage de radicaux variés (Hamid et al., 2014; El-Fadaly et al., 2017; Kishore, 2016; Montaut et al., 2017; Rozan&Boriy, 2022; Sadiq et al., 2014; Awadelkareem et al., 2022). Les graines, l'huile et les feuilles sont particulièrement riches en polyphénols et flavonoïdes, dont sinapique, quercétine, kaempférol, rutin et autres phénoliques identifiés par HPLC ou LC-MS (El-Fadaly et al., 2017;Rozan&Boriy, 2022; Sadiq et al., 2014; Pagnotta et al., 2022). les isothiocyanates issus des glucosinolates (notamment glucoerucine/érucine et divers isothiocyanates soufrés) contribuent aussi au piégeage des radicaux, même s'ils ne sont pas des antioxydants très puissants pris isolément (Montaut et al., 2017;Khoobchandani et al., 2011).

Chez le rat, un extrait éthanolique de graines protège le rein d'une néphrotoxicité au chlorure mercurique, en réduisant la peroxydation lipidique et en restaurant le glutathion et les enzymes antioxydantes (SOD, CAT, GPx, GR) (Alam et al., 2007). Des extraits de graines et de feuilles exercent un effet antitumoral dans un modèle murin de carcinome d'Ehrlich, avec baisse du volume tumoral, normalisation de paramètres hématologiques et amélioration de la survie (Elsadek et al., 2021). L'huile de graines riche en isothiocyanates montre des activités antioxydantes in vitro et des effets antimutagènes et antimélanome in vivo, la combinaison d'isothiocyanates purifiés étant encore plus active que l'huile brute (Khoobchandani et al., 2011;Bansal et al., 2015). Des extraits de feuilles présentent aussi des effets antibactériens et cytotoxiques sur des lignées de cancer colorectal, avec des IC50 de l'ordre de quelques dizaines de µg/mL, tout en montrant une activité antioxydante notable (Awadelkareem et al., 2022). Enfin, la farine de graines déshuilées, appauvrie en acide érucique mais riche en composés phénoliques, conserve une capacité antioxydante et peut être incorporée dans des biscuits fonctionnels sans détérioration sensorielle, tout en augmentant l'apport en phytocomposés (Rozan&Boriy, 2022).

Dans l'ensemble, Eruca sativa apparaît comme une plante riche en polyphénols, flavonoïdes et isothiocyanates, conférant une activité antioxydante marquée et des effets protecteurs dans plusieurs modèles animaux de toxicité rénale et tumorale. Les graines, leur huile et les feuilles représentent des sources potentielles d'ingrédients nutraceutiques ou fonctionnels, même si la question de l'acide

érucique impose d'orienter plutôt vers des fractions déshuilées ou purifiées pour un usage alimentaire étendu.

L'IC_{50} correspond à la concentration nécessaire pour inhiber 50 % du radical DPPH. La détermination graphique réalisée à partir de la courbe de régression a permis d'estimer une valeur d'IC50 de :

IC50=0.41 mg/mL pour l'huile *d'Eruca sativa*

IC50=0.175 mg/mLpour de l'acide ascorbique

La valeur d'IC50 obtenue pour l'huile *d'Eruca sativa* dans la présente étude est de 0,41 mg/mL, ce qui témoigne d'une activité antioxydante appréciable vis-à-vis du radical DPPH. Cette activité reste néanmoins inférieure à celle de l'acide ascorbique (IC50 = 0,17 mg/mL), utilisé comme standard de référence. Une faible valeur d'IC50 étant associée à une plus forte

L'activité antioxydante de l'échantillon analysé est significative, mais elle demeure inférieure à celle de l'acide ascorbique (standard), comme l'indique la comparaison des valeurs d'IC50, où l'échantillon présente une IC50 plus élevée que celle de l'acide ascorbique.

-




Figure 8 Histogramme comparatif des valeurs d'IC50 de l'huile *d'Eruca sativa* et de l'acide ascorbique.

- L'histogramme montre que l'acide ascorbique présente une valeur d'IC50 plus faible (0,17 mg/mL) que celle de l'huile *d'Eruca sativa* (0,41 mg/mL), indiquant une activité antioxydante

plus importante. En effet, une faible valeur d'IC50 traduit une meilleure capacité à neutraliser les radicaux libres. Cependant, l'huile *d'Eruca sativa* présente également une activité antioxydante appréciable, probablement liée à sa richesse en composés bioactifs tels que les tocophérols et les composés phénoliques.

2.2Evaluation de l'activité anti-hémolytique

L'huile d'*Eruca sativa* présente une activité anti-hémolytique dépendante de la concentration, avec une inhibition maximale de 53 % à 1 mg/mL. Toutefois, le diclofénac montre une activité plus élevée, atteignant 77 % à la même concentration. Les valeurs de CI50 indiquent également une efficacité supérieure du diclofénac (0,26 mg/mL) par rapport à l'huile (0,48 mg/mL), puisque une concentration plus faible est nécessaire pour obtenir 50 % d'inhibition. Malgré cela, l'huile de roquette présente une activité protectrice notable contre l'hémolyse, suggérant la présence de composés bioactifs capables de stabiliser les membranes érythrocytaires (Ekor, 2014 ; Cavanagh & Wilkinson, 2005).




Figure 9. Courbe comparative de l'activité **anti-hémolytique** • (Huile *d'Erucasativa* vs Diclofénac)

érythrocytaires contre l'hémolyse induite (Ekor, 2014). Les résultats montrent que le pourcentage d'inhibition augmente avec la concentration, atteignant une valeur maximale de 53 % à 1 mg/mL.

Le diclofénac utilisé comme référence présente une activité anti-hémolytique supérieure avec une inhibition maximale de 77 % et une CI50 de 0,26 mg/mL. Cette différence est attendue puisque le diclofénac est une molécule pharmacologique reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et protectrices (Burt, 2004). Néanmoins, les résultats obtenus démontrent que l'huile d'*Eruca sativa* possède une activité protectrice appréciable d'origine naturelle.

Les résultats obtenus montrent que l'huile d'*Eruca sativa* présente une activité anti-hémolytique dose-dépendante, avec une augmentation progressive du pourcentage d'inhibition en fonction de la concentration. L'inhibition maximale enregistrée est de 53 % à 1 mg/mL, tandis que la CI50 est estimée à 0,48 mg/mL, indiquant une activité protectrice modérée contre l'hémolyse induite (Higdon & Frei, 2003).

Cette activité peut être attribuée à la présence de composés bioactifs, notamment les composés phénoliques et les antioxydants naturels, capables de stabiliser les membranes érythrocytaires (Dai & Mumper, 2010 ; Hamid et al., 2014). En effet, les globules rouges sont particulièrement sensibles au stress oxydatif en raison de leur richesse en acides gras polyinsaturés, ce qui favorise la peroxydation lipidique et conduit à la rupture membranaire. Ainsi, les composés antioxydants présents dans l'huile pourraient agir en limitant ces dommages oxydatifs et en renforçant la stabilité membranaire.


Comparativement, le diclofénac présente une activité anti-hémolytique plus importante avec une inhibition maximale de 77 % et une CI50 de 0,26 mg/mL. Cette différence s'explique par la nature pharmacologique de cette molécule, connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et protectrices plus puissantes (Ekor, 2014). Toutefois, les résultats obtenus confirment que l'huile d'*Eruca sativa* possède un potentiel cytoprotecteur intéressant d'origine naturelle

2.3.Evaluationde l 'activité antibactérienne


L'évaluation de l'activité antimicrobienne de l'huile *d'Eruca sativa* vis-à-vis des souches microbiennes testées n'a révélé aucune zone d'inhibition significativeavec les concentrations suivantes(1, 1/2, 1/4, 1/6)mg/mLLes résultats obtenus indiquent donc une absence d'activité antimicrobienne dans les conditions expérimentales utilisées.Le témoin positif utilisés est ofloxacin qui présente les zones d'inhibition . (Burt, 2004 ; CLSI, 2018).




Esherchiacoli



Pseudomonas aeruginosa



Staphulococcsaureus



Bacillus Cereus



Klebsiella pneumoniae

Figure 10. Effet del'huile*d'Erucasativa*sur les souches bactériennesa différents concentrations (*Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae*)

Les résultats obtenus ont montré que l'huile d'*Eruca sativa* n'a présenté aucune zone d'inhibition significative contre les souches bactériennes testées (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus cereus* et *Klebsiella pneumoniae*) aux concentrations évaluées (Burt, 2004). En revanche, le témoin positif représenté par l'ofloxacine a révélé une activité antimicrobienne importante avec des zones d'inhibition bien définies pour l'ensemble des souches étudiées, confirmant ainsi la validité de la méthode utilisée et la sensibilité des microorganismes testés (CLSI, 2018).

L'absence d'activité antimicrobienne de l'huile peut être attribuée à plusieurs facteurs. D'une part, la nature lipophile de ses constituants limite leur diffusion dans le milieu gélosé utilisé lors de la méthode de diffusion sur disque, ce qui peut conduire à une sous-estimation de l'activité réelle de l'huile (Burt, 2004). D'autre part, les concentrations testées peuvent être insuffisantes pour induire un effet inhibiteur détectable. Par ailleurs, certains composés bioactifs nécessitent des méthodes d'extraction ou d'évaluation plus adaptées afin d'exprimer pleinement leur potentiel antimicrobien (Dai & Mumper, 2010).

Des observations similaires ont été rapportées dans plusieurs études, où certaines huiles végétales riches en composés bioactifs n'ont montré qu'une faible activité antimicrobienne,

voire aucune activité, lorsqu'elles étaient évaluées par diffusion sur gélose. Cette limitation est souvent liée à la faible diffusibilité des composés hydrophobes dans le milieu de culture (Burt, 2004).

Cependant, l'absence d'activité antimicrobienne observée dans cette étude ne remet pas en cause le potentiel biologique global de l'huile d'*Eruca sativa*. En effet, les résultats obtenus pour les activités antioxydante et anti-hémolytique ont montré une efficacité intéressante (Higdon & Frei, 2003). Plusieurs travaux ont démontré que cette huile est riche en composés phénoliques, flavonoïdes et glucosinolates, molécules reconnues pour leurs propriétés antioxydantes et protectrices des membranes cellulaires (Fahey et al., 2001 ; Montaut et al., 2017).

Ainsi, malgré l'absence d'effet antibactérien dans les conditions expérimentales adoptées, l'huile d'*Eruca sativa* demeure une source prometteuse de composés bioactifs pouvant être valorisés dans les domaines cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire (Newman & Cragg, 2020).

3. Propriétés physico-chimiques de produit (le sérum capillaire)

- **Mesure du pH**

La mesure du pH du sérum a été réalisée à température ambiante à l'aide d'un pH-mètre préalablement calibré. Le sérum a été légèrement dilué dans de l'eau distillée afin de faciliter la lecture.

Les résultats obtenus montrent que le sérum présente un **pH de 5,4**, ce qui indique un caractère légèrement acide. Cette valeur est proche du pH physiologique du cuir chevelu, ce qui garantit une bonne tolérance cutanée et limite les risques d'irritation.

L'examen organoleptique a montré que le sérum possède une texture huileuse homogène, un aspect limpide sans séparation de phases et une odeur agréable caractéristique de la lavande. Ces caractéristiques confirment la qualité sensorielle de la formulation (Aulton & Taylor, 2018 ; Barel et al., 2009).

- **Viscosité**

  L'étude de la viscosité a révélé que le sérum présente une fluidité adaptée, permettant une application facile et homogène sur la fibre capillaire, sans effet gras excessif ni lourdeur. La viscosité est un paramètre essentiel dans l'évaluation des formulations

cosmétiques car elle influence directement l'étalement et la perception sensorielle du produit (Martin, 2011).

- **Homogénéité**

  L'observation visuelle a confirmé que la formulation est homogène, sans présence d'agrégats ni séparation de phases, indiquant une bonne stabilité de mélange. L'homogénéité est un critère fondamental de qualité garantissant la bonne dispersion des actifs dans les émulsions cosmétiques (Remington, 2013).

- **Test de centrifugation**

  Après centrifugation, le sérum n'a montré aucune séparation de phases ni précipitation, ce qui confirme sa bonne stabilité physique même sous contrainte mécanique. Ce test est couramment utilisé pour prédire la stabilité des émulsions et accélérer l'évaluation du comportement physique des formulations (Barel et al., 2009).

- **Étude de stabilité**

  Le sérum a conservé ses propriétés physiques et organoleptiques (aspect, odeur, homogénéité) après stockage dans différentes conditions de température. Aucune modification significative n'a été observée, ce qui témoigne d'une bonne stabilité de la formulation dans le temps. Les tests de stabilité sont essentiels pour prédire la durée de vie des produits cosmétiques et leur résistance aux variations environnementales (ICH, 2003).

CONCLUSION



Notre travail est porté sur la formulation et l'évaluation d'un sérum capillaire réparateur à base d'huile d'*Eruca sativa* (roquette) et de phytocéramides, destiné aux cheveux fragilisés par les traitements de défrisage. Les dommages causés par le défrisage chimique, tels que l'altération de la fibre capillaire, la perte de résistance mécanique et la diminution de la brillance, nécessitent le développement de solutions cosmétiques efficaces et sûres (Robbins, 2012 ; Dias, 2015).

L'étude phytochimique de l'huile d'*Eruca sativa* a mis en évidence sa richesse en composés bioactifs, notamment les acides gras essentiels et les antioxydants naturels, susceptibles de contribuer à la protection et à la réparation de la fibre capillaire (Fahey et al., 2001 ; Montaut et al., 2017). Les essais biologiques réalisés ont révélé une activité antioxydante ainsi qu'une activité anti-hémolytique intéressantes, confirmant le potentiel protecteur de cette huile contre les phénomènes liés au stress oxydatif (Higdon & Frei, 2003 ; Hamid et al., 2014).

Le sérum formulé a présenté des caractéristiques physicochimiques satisfaisantes, notamment en termes d'aspect, d'homogénéité et de pH, répondant ainsi aux exigences d'un produit cosmétique destiné à l'application capillaire. Ces paramètres sont essentiels dans l'évaluation de la qualité des formulations cosmétiques et de leur stabilité (Aulton & Taylor, 2018 ; Barel et al., 2009).

L'incorporation des phytocéramides a permis de renforcer l'action réparatrice du produit en favorisant la restauration de la barrière lipidique et l'amélioration de la structure du cheveu, grâce à leur rôle dans la reconstitution des lipides intercellulaires de la fibre capillaire (Coderch et al., 2003 ; Elias, 2005).

Les résultats obtenus démontrent que l'association de l'huile d'*Eruca sativa* et des phytocéramides constitue une approche prometteuse pour le développement d'un sérum capillaire naturel à visée réparatrice. Toutefois, des études complémentaires, notamment des tests de stabilité à long terme et des essais d'efficacité sur volontaires, seraient nécessaires afin de confirmer les performances du produit et d'envisager sa valorisation industrielle (ICH, 2003).En perspective, cette formulation représente une alternative innovante aux soins capillaires conventionnels et contribue à la valorisation des ressources naturelles dans le domaine de la cosmétologie (Dias, 2015 ; Robbins, 2012).

Références Bibliographiques

- Al-Shehbaz, I. A., Beilstein, M. A., & Kellogg, E. A. (2006). *Systematics and phylogeny of the Brassicaceae*. Botanical Journal.
- Alam, M. S., et al. (2007). Protective effect of plant extract against mercuric chloride nephrotoxicity in rats. *Journal of Toxicology*.
- Aulton, M. E., & Taylor, K. (2018). *Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines*. Elsevier.
- Awadelkareem, A. M., et al. (2022). Antioxidant and cytotoxic activities of plant extracts. *Journal of Ethnopharmacology*.
- Bansal, P., et al. (2015). Anticancer potential of isothiocyanates. *Cancer Letters*.
- Barel, A. O., Paye, M., & Maibach, H. I. (2009). *Handbook of Cosmetic Science and Technology*. CRC Press.
- Bell, L., & Wagstaff, C. (2014). *Brassicaceae crops and Eruca sativa*. Horticultural Reviews.
- Bennett, R. N., & Wallsgrove, R. M. (1994). Secondary metabolites in Brassicaceae. *Annual Review of Plant Biology*.
- Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of DPPH method for antioxidant activity. *LWT - Food Science and Technology*.
- Burt, S. (2004). Essential oils: antibacterial properties. *International Journal of Food Microbiology*.
- Cavanagh, H. M. A., & Wilkinson, J. M. (2005). Biological activities of essential oils. *Phytotherapy Research*.
- CLSI (2018). *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing*. Clinical and Laboratory Standards Institute.
- Cragg, G. M., & Newman, D. J. (2013). Natural products in drug discovery. *Journal of Natural Products*.
- Dai, J., & Mumper, R. J. (2010). Plant phenolics and antioxidant activity. *Molecules*.
- Dawson, B., & Trapp, R. G. (2004). *Basic and Clinical Biostatistics*. McGraw-Hill.
- Dias, M. F. R. G. (2015). Hair cosmetics and fiber damage. *International Journal of Trichology*.
- Draelos, Z. D. (2018). *Cosmetic Dermatology*. Wiley-Blackwell.
- Ekor, M. (2014). The growing use of herbal medicines. *Pharmacognosy Reviews*.

- Elias, P. M. (2005). Lipid barrier and skin function. *Journal of Investigative Dermatology*.
- El-Fadaly, H. A., et al. (2017). Phytochemical profile and antioxidant activity of Brassicaceae. *Food Chemistry*.
- Elsadek, M. F., et al. (2021). Antitumor effects of plant extracts in mice. *Biomedicine & Pharmacotherapy*.
- Fahey, J. W., et al. (2001). Glucosinolates in Brassicaceae. *Phytochemistry*.
- Hamid, A. A., et al. (2014). Antioxidant activities of plant extracts. *Food Chemistry*.
- Harborne, J. B. (1998). *Phytochemical Methods*. Chapman & Hall.
- Higdon, J. V., & Frei, B. (2003). Antioxidant status and health. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*.
- ICH (2003). *Stability Testing of New Drug Substances and Products*. International Council for Harmonisation.
- Kishore, G. (2016). Radical scavenging activity of plant extracts. *Journal of Medicinal Plants*.
- Khoobchandani, M., et al. (2011). Isothiocyanates biological effects. *BMC Complementary and Alternative Medicine*.
- Martin, A. (2011). *Physical Pharmacy*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Montaut, S., et al. (2017). Glucosinolates and biological activity. *Phytochemistry Reviews*.
- Motulsky, H. (2014). *Intuitive Biostatistics*. Oxford University Press.
- Newman, D. J., & Cragg, G. M. (2020). Natural products as drug sources. *Journal of Natural Products*.
- Pagnotta, M. A., et al. (2022). Polyphenols in Brassicaceae species. *Plants*.
- Pasini, F., et al. (2012). Chemical differences in rocket species. *Food Chemistry*.
- Remington (2013). *Remington: The Science and Practice of Pharmacy*. Pharmaceutical Press.
- Robbins, C. R. (2012). *Chemical and Physical Behavior of Human Hair*. Springer.
- Rozan, P., & Boriy, S. (2022). Functional properties of defatted seed flour. *Food Research International*.
- Sadiq, M. B., et al. (2014). Phytochemical screening of medicinal plants. *BMC Complementary Medicine*.
- Turan, M., et al. (2007). Traditional uses of Eruca sativa. *Journal of Ethnobiology*

ANNEXES



ANNEXES

Photo :1	
Photo 3	
Photo 4	

ANNEXES





Photo 5	
Photo 7	
Photo 10	

Photo11	
Photo 12 :	







Photographe1. Etape de l'evaluation de l'activite antibactérienne (Méthode de diffusion de Disque sur milieu gélose (originale 2026)